

L'efficacité de la « Pilule Bleue » dans le traitement de la dysfonction érectile

Est-ce vraiment une dysfonction érectile ?

Tous les hommes sont prédisposés à se retrouver un jour ou l'autre dans des situations d'impuissance sexuelle ou ayant des troubles de l'érection. Mais seul votre médecin pourrait vous dire si cette « panne » sexuelle est une dysfonction érectile. Les spécialistes recommandent une consultation médicale si ces « pannes » persistent ou si elles surviennent régulièrement, et que cette consultation est très importante pour détecter les causes de ces troubles de l'érection et savoir les traiter de manière efficace. Même si certains hommes trouvent du mal à en parler, sachez que l'impuissance sexuelle est l'un des troubles sexuels les plus répandus de nos jours, et que vous découvrirez que ce serait beaucoup plus facile que vous le pensiez d'en parler avec votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin concernant l'achat du viagra :

Une fois votre médecin aurait diagnostiqué votre dysfonction érectile, et juger que votre condition nécessite un traitement, il vous proposerait les options disponibles pour le traitement de l'impuissance sexuelle comme les pompes, les injections, les comprimés et pilules... mais vous recommanderait le **Viagra** :

<http://www.medecinenaturelle.net/acheter-viagra.htm> comme traitement idéal pour votre dysfonction érectile. De nos jours, la plupart des hommes optent pour le viagra pour son efficacité plus facile à atteindre et ses résultats sains. Le viagra est à prendre une heure avant l'activité sexuelle et son efficacité dure jusqu'à quatre heures plus tard, dès la première stimulation sexuelle, le viagra vous redonnera la vigueur sexuelle et l'intensité d'une érection rigide et ferme, et qui durera jusqu'à l'épanouissement.

Assurez-vous que le viagra vous convient :

Bien que le viagra est reconnu efficace et sain, ce traitement de la dysfonction érectile pourrait ne pas être efficace chez certains individus. Les hommes qui sont sous un traitement à base de nitrates doivent éviter de prendre du viagra. La combinaison du viagra avec des nitrates pourrait causer une chute dangereuse de la tension artérielle. Le viagra est à éviter aussi dans les cas de problèmes cardiaques. Il est alors très important de consulter un médecin et de lui fournir tous vos antécédents médicaux et les traitements que vous prenez ou que vous auriez pris récemment. Informez-vous sur le fonctionnement du viagra et sur ses éventuels effets secondaires.

Suivez le dosage prescrit :

Le viagra est disponible en trois doses différentes : 25mg, 50mg et 100mg. Les médecins commencent toujours par prescrire la plus faible dose du viagra et ensuite augmenter la dose au fur et à mesure selon la réaction du corps au produit.

Ne jamais modifier le dosage prescrit par votre médecin sans son autorisation, et ne jamais prendre plus d'une dose en 24 heures.

Le viagra n'est pas un produit aphrodisiaque :

Si vous prenez du viagra pour traiter votre dysfonction érectile, ne pensez pas que ce traitement est un simple produit aphrodisiaque qui pourrait renforcer votre libido et accentuer votre désir sexuel ! Le viagra ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles, ni aide à la contraception. Le viagra aide les hommes à avoir et maintenir des érections assez rigides et suffisamment longtemps pour une activité sexuelle réussie après une stimulation sexuelle, et si vos problèmes d'érection sont causés par des facteurs psychiques dus à des conflits dans le couple, essayez de gérer vos problèmes relationnels pour faciliter la manifestation des résultats du viagra.