

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE


MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROTECTION DE LA NATURE



Valeur : 0,80

Imprimés en
héliogravure



Valeur : 0,50



Valeur : 2,00



Valeur : 2,40

Dessinés par
K. KRIM



Format : 29,81 x 40,64 (Dentelure 14 1/2 x 15)
Multicolores — 25 timbres à la feuille

Vente anticipée, les 23 et 24 Décembre 1982

— Dans les Recettes Principales des Postes

D'ADRAR - ECH CHELIFF - LAGHOUAT - OUM EL BOUAGHI
BATNA - BEJAIA - BISKRA - BECHAR - BLIDA - BOUIRA
TAMANRASSET - TEBESSA - TLEMCEN - TIARET - TIZI OUZOU
ALGER - DJELFA - JIJEL - SETIF - SAIDA - SKIKDA
SIDI BEL ABBES - ANNABA - GUELMA - CONSTANTINE
MEDEA - MOSTAGANEM - M'SILA - MASCARA - OUARGLA
ORAN

Vente générale, le 25 Décembre 1982 dans tous les bureaux de poste

ENVELOPPE ILLUSTREE

— Non affranchie : 1,00 D.A.

sera mise en vente du 23 au 30 Décembre 1982 inclus.

L'avifaune algérienne, en totalité ou en partie, subit ou est menacée par la chasse, l'augmentation de l'usage des pesticides, la suppression ou l'altération de biotopes.

Un développement et un renforcement des mesures de protection appropriées, des oiseaux, et de leur milieu, devient indispensable, en particulier pour les espèces les plus menacées.

Les quatre espèces suivantes font partie des oiseaux les plus rares et les plus menacés en Algérie.

L'IBIS CHAUVE : Geronticus erimita (CICONIIFORMES)

L'ibis chauve est un oiseau de 75 cm, au long bec recourbé. La tête est nue et de couleur rouge comme le bec et les pattes. Le reste du plumage est noir avec des reflets vert-bronzé, à l'exception des petites couvertures des ailes qui sont pourprées. Les plumes du cou sont allongées et forment une collerette qui flotte au vent et donne un aspect hisute à l'oiseau.

Les Ibis chauves nichent sur des parois rocheuses en zone assez désertique. Les nids sont relativement petits. La ponte est généralement de 3 oeufs, parfois de 2. L'incubation dure 24 à 25 Jours, mais généralement un seul jeune est élevé.

L'Ibis chauve est une espèce très localisée, qui devient de plus en plus rare. Il ne reste actuellement qu'une seule colonie en Algérie.

L'AIGLE DES STEPPES : Aquila rapax (FALCONIFORMES)

C'est un rapace de grande taille, 65 à 80 cm de longueur, pour une envergure variant de 1,55 à 1,70 m. Le plumage est variable du beige au brun foncé, avec la queue barrée de gris.

Il niche à terre ou sur un arbre élevé. Le nid est plat avec une légère dépression (pour maintenir les oeufs). La ponte est généralement de deux oeufs ; le plus souvent un seul jeune quitte le nid une cinquantaine de jours après l'éclosion.

L'aigle des steppes était commun au 19^{ème} siècle, mais depuis est devenu très rare. Actuellement il semble dispersé de part et d'autre de l'Atlas Tellien.

C'est le plus rare des aigles d'Algérie.

LE GYPAETE BARBU : Gypaëtus barbatus (FALCONIFORMES)

C'est un grand vautour à l'allure de faucon, la tête, emplumée, est claire presque blanche et parsemée de petits traits noirs, elle présente une large bande noire, en travers de l'oeil, terminée en avant par une touffe de plumes (appelée barbe) recouvrant une partie du bec. Les ailes, gris sombre, sont longues et effilées. La queue est sombre et cunéiforme. Le dessous est blanc crème à blanchâtre avec du roux sur la gorge et la poitrine. Le dessus est foncé.

Il niche sur des parois rocheuses. Le nid est très gros tapissé de poils, laine, cordes et chiffons. La ponte est le plus souvent de 2 oeufs ; l'incubation est d'environ 55 jours.

Le Gypaete barbu était largement répandu au siècle dernier dans tout le Maghreb. Mais il est devenu de plus en plus rare depuis le début de notre siècle. On le rencontre au niveau de certains points de l'Atlas Tellien uniquement. Il est très rare dans l'Atlas saharien.

C'est une espèce qui se trouve actuellement à la limite de la disparition. Le nombre de couples en Algérie est vraisemblablement inférieur à la dizaine.

L'OUTARDE HOUBARA : Chlamydotis undulata (GRUIFORMES)

C'est un oiseau de taille moyenne, 64 cm de longueur, au cou élancé et à grandes pattes. Le dessus est roux ou plus ou moins vermiculé. Elle a sur la tête une huppe blanche terminée de noir. Les côtés du cou sont ornés de touffes de plumes blanches et noires qui s'écartent vers l'extérieur. Le ventre est blanc, mais la poitrine est souvent vermiculée. La queue est barrée de bleu.

Elle marche ou court plus souvent qu'elle ne vole.

Elle ne construit pas de nid, sa ponte de 2 à 3 oeufs est déposée dans une légère dépression. Pendant les années sèches, ou lorsque les précipitations sont insuffisantes la ponte n'a pas lieu.

L'outarde houbara est une espèce des steppes semi-désertiques. Son aire de répartition s'est considérablement réduite depuis quelques dizaines d'années du fait de la chasse essentiellement.