

Comment éviter les infestations de la pyrale sur palmier !!!



Les dattes algériennes, ce produit incontournable connu par ses variétés authentiques et savoureuses est le label des produits algériens destinés à l'exportation mais qui continue à faire face aux contraintes à son développement notamment celles d'ordre pathologique et sanitaire, la pyrale est l'une des contraintes majeurs qui continue à causer des pertes chaque année en raison de la mauvaise gestion de celle-ci.

Ce papillon nocturne de couleur grise et répandu dans tous les pays du bassin méditerranéen peut toucher d'autres espèces comme le figuier, l'abricotier et le grenadier et peut compter jusqu'à trois générations sur le champ et une au niveau des entrepôts. Les dégâts commencent à être observés sur les fruits à partir de la deuxième génération qui coïncide avec le stade Bser des dattes ; sensible aux attaques de la pyrale ; et continuent jusqu'au stockage. Les fruits touchés renferment les œufs de la femelle qui se développent en larves à l'intérieur dépréciant ainsi leur qualité.

La lutte contre ce ravageur commence par l'application des mesures prophylactiques dont l'objectif est de minimiser l'inoculum primaire présent dans les palmeraies

ou dans les lieux de stockage par l'entretien et le désherbage des palmeraies, le nettoyage des troncs des palmiers, l'élimination du reste de la récolte et des dattes tombées au sol, l'ensachage des régimes pour empêcher la ponte, le tri des dattes véreuses après la récolte et le nettoyage des entrepôts avec un mélange de chaux et d'un insecticide approprié.



La lutte chimique quant à elle peut avoir lieu dès que le seuil de nuisibilité est atteint et le stade de développement des palmiers devient sensible et peut aller jusqu'à l'après récolte afin de prémunir les dattes stockées des pontes des femelles. La vigilance doit être maintenue surtout pour les phoeniculteurs qui ont déjà remarqué des attaques précédentes de la pyrale sur leurs récoltes.