



Wilayate concernées : Constantine, Bordj Bou Arréridj
Jijel, Mila, Sétif, Oum El Bouaghi

Siège de la station : 5^{ème} km route de Batna
Adresse postale : 25022 - Les mûriers Constantine

: 031 64 90 06
: 031 64 90 06

email : srpv25@hotmail.fr

BULLETIN N°15

31 octobre 2017

Noctuelles (chenilles) sur culture maraichère

Les conditions météorologiques qui ont prévalu cette semaine (températures clémentes et peu de pluies) s'avèrent favorables à la pullulation des noctuelles défoliatrices.

Le risque de ponte et de futurs dégâts des nouvelles chenilles (très voraces et polyphages) sur feuilles peuvent atteindre un niveau critique.

Plusieurs espèces de chenilles de noctuelles s'attaquent aux cultures maraichères et fourragères durant l'automne et l'hiver, les principales sont les suivantes :

- Piéride du chou
- Noctuelle du chou
- Piéride de la rave
- Noctuelle spodoptera sp.

La première apparition de ces noctuelles a été déjà constatée au cours de cette semaine dans la commune de Grarem Gouga, wilaya de Mila sur la culture de **pomme de terre d'arrière saison** qui se trouve au stade croissance végétative.

Afin d'éviter la pression de ces noctuelles qui risquent de rester toutefois très fortes dans tous les secteurs de production, les agriculteurs sont invités à déclencher un traitement dès à présent en utilisant l'un des insecticides homologués mentionnés dans le tableau ci-joint.



Adulte piéride du chou



Adulte noctuelle du chou



Chenilles piéride du chou



Dégâts piéride du chou



Œufs piéride du chou



التنبهات الزراعية Avertissements Agricoles



Wilayate concernées : Constantine, Bordj Bou Arréridj
Jijel, Mila, Sétif, Oum El Bouaghi

Siège de la station : 5^{ème} km route de Batna
Adresse postale : 25022 - Les mûriers Constantine

☎ : 031 64 90 06
☎ : 031 64 90 06

email : srpv25@hotmail.fr

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري

المعهد الوطني لحماية النباتات

المحطة الجهوية
لحماية النباتات قسنطينة

الولايات المعنية : برج بوعريش،
قسنطينة، جيجل، ميلة، سطيف، أم البواقي
مقر المحطة : الكائن الخامس - طريق باتنة
عن المساحة : 25022 - عن التوت - قسنطينة

☎ : 031 64 90 06
☎ : 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

إنذار مبكر رقم 15 31 أكتوبر 2017

يرقات الفراشات الليلية علي الخضروات

إن الظروف المناخية السائدة خلال هذا الأسبوع (حرارة معتدلة مع قلة الأمطار) جد مناسبة لتكاثر وانتشار اليرقات الليلية آكلات الأوراق.

إن خطر وضع البيوض والخسائر المتوقع حدوثها على الأوراق عدة عوائل يحتمل أن تكون معتبرة جراء اليرقات الجديدة الناشئة، الشرهة جدا.

هناك عدة أنواع من الديدان الليلية تهاجم المحاصيل الزراعية كالخضروات والأعلاف خلال الخريف والشتاء ومن أبرزها ما يلي:

- الفراشات الليلية للملفوف
- الفراشة البيضاء (أبو دقيق الكرنب)
- ديدان الأوراق صنف Spodoptera
- فراشة أبو دقيق الملفوف

قد تم اكتشاف أول ظهور لهذه الفراشات الليلية في بلدية قرارم قوقة، ولاية ميلة خلال هذا الأسبوع على محصول البطاطا البعد موسمية المتواجدة حاليا في مرحلة النمو الخضري.

لتجنب تزايد أعداد الفراشات الليلية والتي يمكن أن يبقى تأثيرها عنيف على جميع القطاعات الزراعية المنتجة، فإن الفلاحين مدعوون لتطبيق العلاج منذ الآن بأحد المبيدات الحشرية المرخصة المدونة بالجدول المرفق.



الحشرة البالغة للفراشة البيضاء



الفراشات الليلية للملفوف



يرقات الفراشة البيضاء



أضرار الفراشة البيضاء

بيوض الفراشة البيضاء

Tableau : **INSECTICIDES HOMOLOGUES CONTRE LES NOCTUELLES**

المبيدات الحشرية المرخصة ضد الديدان الليلية

NOM COMMERCIAL الاسم التجاري	MATIERE ACTIVE المادة الفعالة	Dose الجرعة	NOM COMMERCIAL الاسم التجاري	MATIERE ACTIVE المادة الفعالة	Dose الجرعة
ALPHACIDE 50 EC	Alpha Cyperméthrine	30-50 ml/hl tomate pdt	DOMINANT 2.5 EC	Beta Cyfluthrine	50 ml/hl
ARIZONATE	Indoxacarbe	160-250 l/ha	ELECTRA	Lufénuron	0,5 l/ha
ATIFOS	Chlorpyriphos Ethyl	150-200 ml/hl	FASTAC 100 EC	Alpha Cyperméthrine	100 ml/ha
BIOPROT KURSTAKI	Bacillus thuringiensis	0.5- 1 kg/ha	GLORY 5 EC	Lufénuron	50 ml/hl tomate
BIO-T- PLUS 2	Bacillus thuringiensis	0.5 kg/ha	GRAND 5% EC	Lufénuron	1-2 l/ha 0.5 l/ha pdt 0.5- 1 l/ha C. ind.
BULDOCK 0.25 SC	Beta Cyfluthrine	0.3-0.5 l/ha	GUERISSEUR	Deltaméthrine	0.3 l/ha
CARLOFOS 48 EC	Chlorpyriphos Ethyl	100-150 ml/hl MAIS	JUDOKA 50 EC	Lambda Cyhalothrine	0.25 l/ha
CHECK 10 EC	Beta Cyperméthrine	0,15 à 0,25 l/ha	KARATE ZEON	Lambda Cyhalothrine	0.25 l/ha
CIRTAN EC	Cyperméthrine	15 à 20 ml/hl	NOMOLT	Teflubenzuron	35 à 70 ml/hl Tomate
COMODOR	Imidaclopride	0,3 à 0,5 l/ha	PICADOR 20% SL	Acetamipride	25 à 50 ml/hl
CYCLONE 5EC	Lambda Cyhalothrine	0,5 l/ha	PROACT 50 EC	Emamectin Benzoate	200 ml/ha tomate
CYPER AS 25 EC	Cyperméthrine	120 à 200 ml/ha	PROCLAIM	Emamectine Benzoate	170 -340 g/ha
CYPERMETHRINE 10 EC	Cyperméthrine	25 à 50 ml/hl	PROMED 5 SG	Emamectine Benzoate	350 g/ha tomate
CYPERMIGHT 10 EC	Cyperméthrine	25 à 50 ml/hl	POWER 10% EC	Cyperméthrine	25 à 50 ml/hl
CYPERMIGHT SUPER 25 EC	Cyperméthrine	25 ml/hl tomate	PULSAR 2.5 EC	Lambda Cyhalothrine	0,5 l/ha
CYPRA –PLUS 25 EC	Cyperméthrine	12 ml/hl	PYRICAL 480 EC	Chlorpyriphos	125 -150 ml/hl
CYRUX	Cyperméthrine	12 à 20 ml/hl	RADIANT* 120 SC	Spinetoram	50 ml/hl tomate
CYTHRINE 10 EC	Cyperméthrine	300 à 500 ml/ha	RIDER	Lambda Cyhalothrine	75 g/ha
CYTHRINE 250 EC	Cyperméthrine	120 à 200 ml/hl	SHERPA 2 GC	Cyperméthrine	15-20 kg/ha
CYREN	Chlorpyriphos Ethyl	100 à 150 ml/hl	SHERPA 25 EC	Cyperméthrine	12 ml/hl
CYTHRIN 250 EC	Cyperméthrine	120 à 200 ml/ha	TATAREEVA 2.5 EC	Lambda Cyhalothrine	0.5 l/ha
DECIS 25 EC	Deltaméthrine	0,5 l/ha	TRACER 240 SC	Spinosad	60 ml/hl
DELTACAL 25 EC	Deltaméthrine	300 ml/ha laitue	TRIGER 5 EC	Lambda Cyhalothrine	25 ml/hl
DELTACIS 25 EC	Deltaméthrine	0,3 l/ha	ZELSBAN 48 EC	Chlorpyriphos	150 ml/hl
DELTAMETHRINE 2.5 EC	Deltaméthrine	0,5 l/ha			

Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2016.

ENGE0	THIAMETHOXAM+LAMBDA CYHALOTHRINE	200 ml/ha	Certificat d'homologation n° 17 56 031 établi le 17 sep 2017
-------	-------------------------------------	-----------	--

Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec la SRPV ou le service technique le plus proche.

للمزيد من المعلومات اتصلوا بالمحطة الجهوية لحماية النباتات بالكيلومتر الخامس قسنطينة أو المصالح الفلاحية القريبة منكم.