

## Avertissements Agricoles

## التنبيهات الزراعية

Wilayates Concernées :  
Constantine, Bordj Bou  
Arreridj, Sétif, Mila,  
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :  
5<sup>ème</sup> Km route de Batna

☎ : 031 64 90 06  
☎ : 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr



الولايات المعنية : قسنطينة،  
برج بوعرييج، سطيف،  
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر  
الخامس - طريق باتنة

☎ : 031 64 90 06  
☎ : 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

## Petites altises (altises des crucifères) (*Phyllotreta sp.*)

Bulletin N° 01 24 décembre 2020

Les petites altises sont de petits coléoptères qui s'attaquent aux jeunes colzas en cours de levée en grignotant les cotylédons et les jeunes feuilles.

Les morsures circulaires, perforantes ou non, peuvent s'accumuler rapidement et présenter un risque pour les plantules peu développées.

Les sorties sur terrain effectuées cette semaine, nous ont permis de détecter les premières attaques de ce redoutable insecte sur Colza, variété hybride (InVigor) qui se trouve actuellement à un stade relativement sensible 3 à 4 feuilles déployées et ont été localisées précisément aux :

- Lieu dit Boufouh et Ferme pilote Amira, wilaya de Mila
- Ferme pilote Rekani, commune de Hamma Bouziane, Ferme pilote Rahal Ben Boudali, commune d'Ibn Ziad, wilaya de Constantine
- Ferme pilote Bouteraa, commune d'El Ouldja, wilaya de Sétif.

La lutte insecticide contre les petites altises doit se raisonner à la parcelle et ne s'envisager que si la survie de la culture est menacée

Les captures dans les cuvettes jaunes servent à détecter l'arrivée puis l'activité des altises. Ces dernières ne sont pas un outil de décision de traitement. C'est l'observation très régulière, à la parcelle, de l'état du colza entre les stades cotylédons et 3-4 feuilles qui guide le raisonnement.

En conséquence, les agriculteurs sont vivement invités à la vigilance et à la surveillance au quotidien des attaques d'altise sur plantules et d'effectuer un traitement si s'avère nécessaire en utilisant un insecticide à base de la matière active lambda-cyhalothrine homologué contre l'altise sur vigne et cultures maraichères en utilisant les doses préconisées pour la culture de colza.

L'altise est active surtout dans les premières heures qui suivent la tombée de la nuit. C'est pourquoi l'application en soirée est à privilégier



Adulte



Cuvette jaune



Dégâts sur cotylédons et  
feuilles

## Avertissements Agricoles

## التنبهات الزراعية

Wilayates Concernées :  
Constantine, Bordj Bou  
Arreridj, Sétif, Mila,  
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :  
5<sup>ème</sup> Km route de Batna

031 64 90 06

031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr

الولايات المعنية : قسنطينة،  
برج بوعريش، سطيف،  
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر  
الخامس - طريق باتنة

031 64 90 06

031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

## خنفس البراغيث الصليبية الصغيرة (*Phyllotreta sp.*)

إنذار مبكر رقم : 01 24 ديسمبر 2020

خنفس البراغيث الصغيرة هي خنافس صغيرة تهاجم النباتات الفتية للسلمج في مرحلة نشأتها عن طريق قضم الفلقات والأوراق الصغيرة.

يمكن أن تتراكم اللدغات الدائرية، المثقبة أو غير المثقبة، بسرعة وأن تشكل خطرا بتدمير الشتلات الضعيفة.

لقد مكنتنا الخرجات الميدانية التي تم إجراؤها هذا الأسبوع من كشف الهجمات الأولى لهذه الحشرة الضارة على السلمج، الصنف الهجين (إنفيكور) والتي توجد حاليًا في مرحلة حساسة نسبيًا 3 إلى 4 أوراق منتشرة والمتواجدة بالضبط في الأماكن الأتية :

- المكان المسمى بوفوح والمزعة النموذجية أعميرة، ولاية ميلة
- المزعة النموذجية ركاني، بلدية حامة بوزيان، المزعة النموذجية رحال بن بودالي، بلدية ابن زياد، ولاية قسنطينة.
- المزعة النموذجية، بوترة، بلدية الولجة، ولاية سطيف.

يجب أن تبنى المكافحة بالمبيدات الحشرية ضد خنافس البراغيث الصغيرة في الحقل ولا يتم تجسيدها إلا إذا كان المحصول مهددًا.

استخدام الأوعية الصفراء كمصائد للكشف عن وصول خنافس البراغيث ثم نشاطها. هذه الأخيرة ليست أداة قرار لمباشرة العلاج. بل الملاحظة الدورية والمنتظمة للحقل، وحالة السلمج بين مرحلة النبتة و3-4 أوراق هي دليل للإتحاد القرار.

وبالتالي، يُنصح المزارعون بتوخي اليقظة ومراقبة الهجمات اليومية لخنافس البراغيث على الشتلات وإجراء العلاج إذا لزم الأمر باستخدام مبيد حشري مكون من مادة لمبداسيالوترين مرخص على خنافس البراغيث على الكروم والخضروات باستعمال الجرع الموصى بها لمحصول السلمج

تكون خنافس البراغيث نشطة خاصة في الساعات الأولى بعد حلول الظلام. هذا هو السبب في تفضيل تطبيق العلاج في المساء



الحشرة البالغة



وعاء أصفر



الأضرار على الفلقات والأوراق